


Podrías pagar
un copago tan
reducido como \$0



APRETUDECopayProgram.com

APRETUDE y Tú:
Guía de acceso
y apoyo

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

Consulta la Información importante de seguridad que aparece en todo este folleto, incluida una advertencia importante. Consulta los Datos importantes que se adjuntan sobre APRETUDE.

Es hora de APRETUDE (cabotegravir)



La primera y única profilaxis preexposición (PrEP) inyectable de acción prolongada para reducir el riesgo de contraer VIH.*



No hay que recordar ninguna píldora diaria de PrEP mientras recibes tus inyecciones regulares de APRETUDE.



Después de 2 inyecciones iniciales administradas con un mes de diferencia, **APRETUDE se administra tan solo 6 veces al año.**



Diseñado para ayudar a prevenir de forma continua el riesgo de contraer VIH cuando se reciben cada dos meses.

¿Qué es APRETUDE?

APRETUDE es un medicamento recetado que se usa como PrEP del VIH 1 para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1 en adultos y adolescentes que pesan al menos 77 libras (al menos 35 kg).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de APRETUDE?

Información importante para las personas que reciben APRETUDE como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a reducir su riesgo de contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH 1):

Antes de recibir APRETUDE para reducir tu riesgo de contraer el VIH 1, debes ser VIH 1 negativo para comenzar con APRETUDE. No recibas APRETUDE a menos que te hagas una prueba y confirmes que eres VIH 1 negativo.

- **Algunas pruebas de VIH 1 pueden no detectar la infección por VIH 1 en una persona que se haya infectado recientemente.** Informa a tu proveedor de salud si has tenido una enfermedad similar a la gripe en el mes anterior a comenzar con APRETUDE o en cualquier momento mientras recibas APRETUDE. Los síntomas de una nueva infección por VIH 1 incluyen: cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dolor de garganta; erupción cutánea; ganglios linfáticos inflamados en el cuello o la ingle; fiebre; dolor de cabeza; vómitos o diarrea; o sudores nocturnos

*Según lo estudiado en 2 estudios clínicos con casi 8,000 participantes, entre los que se encontraban hombres cisgénero VIH negativos, y mujeres transgénero y mujeres cisgénero en riesgo de contraer VIH.

Consulta la Información importante de seguridad adicional que aparece en todo este folleto, incluida una advertencia importante sobre el riesgo de resistencia al fármaco si te vuelves VIH positivo. Consulta los Datos importantes que se adjuntan sobre APRETUDE.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

¿Podría APREUDE (cabotegravir) ser adecuado para ti?

Hazte estas preguntas:

- ¿Eres VIH-1 negativo?
- ¿A veces tienes relaciones sexuales sin condón?
- ¿Alguna vez tuviste una ITS?
- ¿Vives en un área con una alta tasa de VIH?
- ¿Tu pareja sexual tiene un estado de VIH desconocido?
- ¿Podría una inyección de PrEP cada dos meses estar acorde con tu estilo de vida?[†]

Si respondiste SÍ a alguna de estas preguntas, consulta a tu proveedor de atención médica sobre APREUDE.

APREUDE es administrado cada dos meses por un proveedor de atención médica después de administrar las inyecciones de inicio con 1 mes de diferencia durante 2 meses consecutivos. Permanece bajo el cuidado de un proveedor de atención médica mientras recibes APREUDE. Debes recibirlo según el cronograma. Si omites una inyección programada durante más de 7 días, llama a tu proveedor de atención médica de inmediato.

^{*} Debes ser VIH-1 negativo para iniciar y continuar con APREUDE. Tu proveedor de atención médica te hará una prueba de detección de VIH antes de cada inyección, además de hacerte pruebas de ITS mientras tomas APREUDE.

[†] Es importante asistir a todas las citas de APREUDE.

ITS = infección de transmisión sexual.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Qué es lo más importante que debo saber sobre APREUDE? (continuación)

Mientras recibas APREUDE como PrEP para el VIH 1:

- **APREUDE no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Practica relaciones sexuales más seguras mediante el uso de un condón de látex o poliuretano para reducir el riesgo de contraer ITS**
- **Debes permanecer VIH 1 negativo para continuar recibiendo APREUDE como PrEP para el VIH 1**
 - Conoce tu estado respecto al VIH 1, así como el estado de tus parejas. Si crees que estuviste expuesto al VIH 1, informa a tu proveedor de salud de inmediato
 - Tu riesgo de contraer el VIH 1 es menor si tus parejas con VIH 1 están recibiendo un tratamiento eficaz
 - Hazte la prueba del VIH 1 con cada inyección de APREUDE o cuando te lo indique tu proveedor de salud. No te saltes ninguna prueba del VIH 1. Si contraes el VIH 1 y continúas recibiendo APREUDE porque no sabes que estás infectado por el VIH 1, la infección por VIH 1 puede volverse más difícil de tratar
 - Hazte la prueba de otras ITS. Estas infecciones facilitan la infección por VIH 1
 - Habla con tu proveedor de salud sobre las maneras de reducir tu riesgo de contraer el VIH 1
 - No te saltes ninguna inyección de APREUDE. No cumplir con las inyecciones aumenta tu riesgo de contraer la infección por VIH 1



 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

Cómo solicitar APRETUDE (cabotegravir)

Ten en cuenta estas cosas:

- ¿Te resulta difícil tragar comprimidos?
- ¿Te olvidas a veces de tomar alguna dosis de su comprimido diario de PrEP?
- ¿Recibir una opción de PrEP una vez cada dos meses iría bien con tu estilo de vida?
- ¿Te preocupa que las personas vean tus comprimidos de PrEP y te hagan preguntas?
- ¿Preferirías una opción de PrEP que no contenga tenofovir?

Si tienes alguna de estas inquietudes, tal vez desees hablar con tu proveedor de atención médica sobre APRETUDE.

¿Qué sucede si mi compañía de seguros desea que tome una PrEP genérica?

Algunas compañías de seguros pueden requerir que tomes comprimidos orales diarios de PrEP. Pero si tienes alguna de las inquietudes mencionadas anteriormente, informa a tu proveedor de atención médica al respecto. Es posible que se pueda trabajar con tu compañía de seguros para lograr que comiences a recibir APRETUDE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Quién no debería recibir APRETUDE?

No recibas APRETUDE si:

- **ya tienes VIH 1 o no conoces tu estado respecto al VIH 1.**
Si eres VIH 1 positivo, debes tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APRETUDE solo puede ayudar a reducir tu riesgo de contraer la infección por VIH 1 **antes** de infectarte. **Si tienes VIH 1 y solo recibes APRETUDE, con el tiempo, tu VIH 1 puede volverse más difícil de tratar**
- eres alérgico al cabotegravir
- estás tomando ciertos medicamentos: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; o rifapentine



Consulta la Información importante de seguridad adicional que aparece en todo este folleto, incluida una advertencia importante sobre el riesgo de resistencia al fármaco si se vuelve VIH positivo. Consulta los Datos importantes que se adjuntan sobre APRETUDE.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

Cobertura y costos de APRETUDE (cabotegravir)

APRETUDE ahora está cubierto por la mayoría de las aseguradoras privadas y la mayoría de los planes de Medicaid*

- Los pacientes comerciales podrían ser elegibles para un copago tan reducido como \$0.
- Cubierto para la mayoría de los pacientes con Medicaid.

*Para quienes tienen cobertura en virtud del beneficio médico. Los planes de seguros pueden variar; comuníquese con Viiv Connect o con tu proveedor de salud para ver qué significa esto en tu caso. Fuente: Los datos de cobertura son proporcionados por Managed Markets Insight & Technology, LLC, al mes de julio de 2023.

**Llama a tu compañía de seguros y pídele
que te explique cómo funciona tu
cobertura de PrEP.**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APRETUDE?

APRETUDE puede causar efectos secundarios graves:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar APRETUDE. **Deja de recibir APRETUDE y solicita atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea con alguna de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
- **Problemas hepáticos.** Han ocurrido problemas hepáticos en personas con o sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. **Llama a tu proveedor de salud de inmediato si tienes cualquiera de los siguientes síntomas:** tu piel o la parte blanca de tus ojos se pone amarilla; orina oscura o de color del té; heces de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; o picazón
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si desarrollas alguno de los siguientes síntomas: tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño

Cobertura y costos de APRETUDE (cabotegravir)



El Programa de ahorros APRETUDE

Para las personas elegibles con seguro:

- Es posible **que pagues un copago tan reducido como \$0** por inyección recetada de APRETUDE.
- Una vez inscrito, solo tienes que proporcionar los códigos de los cupones a su farmacia especializada y a tu proveedor de atención médica.
- Verifica si eres elegible en **APRETUDECopayProgram.com** o escanea el código QR en la portada de este folleto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APRETUDE? (continuación)

Los efectos secundarios más comunes de APRETUDE incluyen:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, hematomas, enrojecimiento, picazón, calor, pérdida de sensibilidad en el lugar de la inyección, absceso y decoloración; diarrea; dolor de cabeza; fiebre; cansancio; problemas para dormir; náuseas; o mareos
- Estos no son todos los posibles efectos secundarios de APRETUDE. Llama a tu proveedor de salud para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios

Antes de recibir APRETUDE, infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- alguna vez has tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir
- tienes o has tenido problemas hepáticos
- alguna vez has tenido problemas de salud mental
- tienes o has tenido problemas renales
- estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si APRETUDE dañará a tu bebé en gestación. APRETUDE puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección. Informa a tu proveedor de salud si quedas embarazada mientras recibes o después de recibir APRETUDE

Consulta la Información importante de seguridad adicional que aparece en todo este folleto, incluida una advertencia importante sobre el riesgo de resistencia al fármaco si se vuelve VIH positivo.

Consulta los Datos importantes que se adjuntan sobre APRETUDE.



ViiVConnect está comprometido con ayudar tanto a los pacientes como a los proveedores de atención médica a explorar formas de acceder a los medicamentos con receta de ViiV Healthcare. Un coordinador de acceso de ViiVConnect puede ayudarte con las reclamaciones de seguro o a determinar los gastos de bolsillo.



Pregunta a tu proveedor de atención médica sobre tus opciones de cobertura a fin de que trabaje junto con ViiVConnect para ayudar a garantizar tu cobertura.

1-844-588-3288 (número gratuito) De lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 11:00 p. m. (hora del Este)



Programa de asistencia al paciente

Para las personas elegibles sin seguro:

- Este programa ofrece medicamentos con receta de ViiV Healthcare sin costo alguno.
- Visita **ViiVConnect.com** para obtener más información.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

Antes de recibir APRETUDE, informa a tu proveedor de atención médica sobre todas tus afecciones médicas, incluso si: (continuación)

- estás amamantando o planeas hacerlo. APRETUDE podría pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé mientras recibes o después de recibir APRETUDE

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

- Algunos medicamentos pueden interactuar con APRETUDE. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar edicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud**

¿Estás considerando tomar APREUDE (cabotegravir)?

Habla con tu médico para saber si APREUDE es adecuado para ti. Solo hay tres pasos para comenzar*:

- 1 Hazte la prueba de detección de VIH†**
- 2 Solicita una receta a tu proveedor de atención médica**
- 3 Acude a todas tus citas de APREUDE según el cronograma**

Recuerda que si:

- Te resulta difícil sumar un comprimido diario de PrEP a tu rutina.
- Te olvidas a veces de tomar alguna dosis de tu comprimido diario de PrEP.
- Crees que recibir una opción de PrEP una vez cada dos meses iría bien con tu estilo de vida.

Entonces, APREUDE podría ser adecuado para ti.

- Te preocupa que las personas puedan ver tus comprimidos de PrEP y te hagan preguntas.
- Prefieres una opción de PrEP que no contenga tenofovir.

Ser tu propio defensor es de gran ayuda... habla con tu proveedor de atención médica sobre cómo comenzar a usar APREUDE hoy mismo.

* Tu proveedor de atención médica puede recetarte aproximadamente un mes de comprimidos para comenzar una vez al día.

† Debes ser VIH-1 negativo para iniciar y continuar con APREUDE. Tu proveedor de atención médica te hará una prueba de detección de VIH antes de cada inyección, además de hacerte pruebas de ITS mientras tomas APREUDE.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continuación)

¿Cómo se me administrará APREUDE?

- APREUDE se te administrará en forma de inyección por tu proveedor de salud
- APREUDE se administra inicialmente mediante una inyección en el glúteo 1 vez al mes durante los primeros 2 meses y luego mediante una inyección 1 vez cada 2 meses
- Antes de recibir tu primera inyección de APREUDE, tu proveedor de salud puede pedirte que tomes 1 pastilla de cabotegravir oral 1 vez al día durante 1 mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia al cabotegravir
- APREUDE es un medicamento de acción prolongada y puede permanecer en tu cuerpo durante 12 meses o más después de la última inyección
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud mientras recibas APREUDE. Es importante que recibas APREUDE según lo programado
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de APREUDE por más de 7 días, llama de inmediato a tu proveedor de salud para analizar tus opciones de PrEP
- Si dejas de recibir APREUDE, habla con tu proveedor de salud acerca de otras opciones para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1

Te recomendamos que reportes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.



Consulta la Información importante de seguridad adicional que aparece en todo este folleto, incluida una advertencia importante sobre el riesgo de resistencia al fármaco si se vuelve VIH positivo. Consulta los Datos importantes que se adjuntan sobre APREUDE.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension