



**PREGUNTA A TU
MÉDICO ACERCA DE**



Apretude
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

POR QUÉ APRETUDE >

ESTUDIOS CLÍNICOS >

COBERTURA Y APOYO >

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante.
Consulta la Información de prescripción completa y la Información para el Paciente de APRETUDE.

Visita es.APRETUDE.com

TRAJE TU A-GAME A TU SALUD SEXUAL

Y pregúntale a tu médico sobre APRETUDE
para la prevención del VIH

¿Qué es APRETUDE?

APRETUDE es un medicamento recetado que se usa como PrEP del VIH 1 para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1 en adultos y adolescentes que pesan al menos 77 libras (al menos 35 kg).

Practica relaciones sexuales más seguras para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.



Apretude
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

» QUÉ DEBES SABER SOBRE APRETUDE

La primera PrEP inyectable de acción prolongada que ha demostrado reducir el riesgo de contraer el VIH



Cada dosis ayuda a darte 2 meses de protección continua contra el VIH



Se demostró que APRETUDE es superior en la reducción del riesgo de contraer el VIH que TRUVADA una vez al día*



Entre los estudios sobre PrEP más diversos jamás realizados: hombres cisgénero VIH negativos, mujeres transgénero y mujeres cisgénero, y de una variedad de edades y grupos étnicos

APRETUDE es administrado por un proveedor de salud cada 2 meses después de que hayas recibido inyecciones de inicio con 1 mes de diferencia durante 2 meses consecutivos. Mantente bajo el cuidado de un proveedor mientras recibas APRETUDE. Debes recibirlo según lo programado. Si te vas a saltar tu inyección programada por más de 7 días, llama a tu proveedor de inmediato.

*Basado en dos estudios clínicos separados en los que las transmisiones de VIH ocurrieron 3 veces menos frecuentemente en hombres cisgénero y mujeres transgénero y 12 veces menos frecuentemente en mujeres cisgénero que recibieron APRETUDE que con TRUVADA una vez al día.

PrEP = profilaxis preexposición.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de APRETUDE?

Información importante para las personas que reciben APRETUDE como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a reducir su riesgo de contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH 1):

Antes de recibir APRETUDE para reducir tu riesgo de contraer el VIH 1, debes ser VIH 1 negativo para comenzar con APRETUDE. No recibas APRETUDE a menos que te hagas una prueba y confirmes que eres VIH 1 negativo.

• **Algunas pruebas de VIH 1 pueden no detectar la infección por VIH 1 en una persona que se haya infectado recientemente.** Informa a tu proveedor de salud si has tenido una enfermedad similar a la gripe en el mes anterior a comenzar con APRETUDE o en cualquier momento mientras recibas APRETUDE. Los síntomas de una nueva infección por el VIH 1 incluyen: cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dolor de garganta; erupción cutánea; ganglios linfáticos inflamados en el cuello o la ingle; fiebre; dolor de cabeza; vómitos o diarrea; o sudores nocturnos

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la Información para el Paciente de APRETUDE.

ESTUDIOS CLÍNICOS UNO DE LOS ESTUDIOS DE PrEP MÁS DIVERSOS JAMÁS REALIZADOS

En estos ensayos clínicos, los participantes fueron asignados aleatoriamente a recibir APRETUDE + placebo de TRUVADA o bien TRUVADA + placebo de APRETUDE. Ni los pacientes ni los investigadores sabían qué medicamento estaban recibiendo.



Casi 8,000 participantes



Incluyendo hombres cisgénero VIH 1 negativos, mujeres transgénero y mujeres cisgénero que eran conductualmente vulnerables al VIH

VER LOS RESULTADOS: Pasa a la página siguiente

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de APRETUDE? (continúa)

Mientras recibas APRETUDE como PrEP para el VIH 1:

- APRETUDE no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Practica relaciones sexuales más seguras mediante el uso de un condón de látex o poliuretano para reducir el riesgo de contraer ITS
- Debes permanecer VIH 1 negativo para continuar recibiendo APRETUDE como PrEP para el VIH 1
 - Conoce tu estado respecto al VIH 1, así como el estado de tus parejas. Si crees que estuviste expuesto al VIH 1, informa a tu proveedor de salud de inmediato
 - Tu riesgo de contraer el VIH 1 es menor si tus parejas con VIH 1 están recibiendo un tratamiento eficaz
 - Hazte la prueba del VIH 1 con cada inyección de APRETUDE o cuando te lo indique tu proveedor de salud. No te saltes ninguna prueba del VIH 1. Si contraes el VIH 1 y continúas recibiendo APRETUDE porque no sabes que estás infectado por el VIH 1, la infección por VIH 1 puede volverse más difícil de tratar
 - Hazte la prueba de otras ITS. Estas infecciones facilitan la infección por VIH 1
 - Habla con tu proveedor de salud sobre las maneras de reducir tu riesgo de contraer el VIH 1
 - No te saltes ninguna inyección de APRETUDE. No cumplir con las inyecciones aumenta tu riesgo de contraer la infección por VIH 1

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la Información para el Paciente de APRETUDE.

4,566 HOMBRES CISGÉNERO, MUJERES TRANSGÉNERO Y PERSONAS VIH 1 NEGATIVOS EN RIESGO DE CONTRAER EL VIH



de los participantes de EE. UU. se identificaron como **hombres negros/afroamericanos**



de los participantes a nivel global se identificaron como **mujeres transgénero**



de los participantes de EE. UU. se identificaron como **hispanos/latinos**



Casi dos tercios de los participantes a nivel mundial tenían **menos de 30 años**. La edad media fue 26.

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

» **MÁS PERSONAS PERMANECIERON VIH NEGATIVAS CON APREUDE QUE CON TRUVADA DURANTE EL ESTUDIO**

LAS TRANSMISIONES DEL VIH OCURRIERON APROXIMADAMENTE

3 VECES MENOS

CON APREUDE QUE CON TRUVADA

APREUDE

12 de cada 2,278 personas recibieron un diagnóstico de VIH positivo

VS

TRUVADA

39 de cada 2,281 personas recibieron un diagnóstico de VIH positivo

Los participantes tomaron el producto una media de 1.3 años. Los resultados pueden variar.



Después de esta parte del estudio, los participantes fueron encuestados. **El 96% de los que respondieron en el estudio de los EE. UU. eligieron APREUDE en lugar de TRUVADA como su opción de PrEP***

*Al concluir el estudio, se ofreció a los participantes la opción de continuar el estudio con APREUDE o con TRUVADA. De los 1,698 pacientes en el estudio, 803 (47%) tenían datos de preferencia disponibles. Los participantes que prefirieron una opción oral de PrEP podrían haber elegido no inscribirse en el estudio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Quién no debería recibir APREUDE?

No recibas APREUDE si:

- **ya tienes VIH 1 o no conoces tu estado respecto al VIH 1.** Si eres VIH 1 positivo, debes tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APREUDE solo puede ayudar a reducir tu riesgo de contraer la infección por VIH 1 **antes** de infectarte. **Si tienes VIH 1 y solo recibes APREUDE, con el tiempo, tu VIH 1 puede volverse más difícil de tratar**
- eres alérgico al cabotegravir
- estás tomando ciertos medicamentos: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; o rifapentine

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APREUDE?

APREUDE puede causar efectos secundarios graves:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar APREUDE. **Deja de recibir APREUDE y solicita atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea con alguna de las siguientes señales**

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la [Información para el Paciente](#) de APREUDE.

3,224 MUJERES CISGÉNERO VIH 1 NEGATIVAS EN RIESGO DE CONTRAER EL VIH



3,224 mujeres en **África**
subsahariana participaron



La mitad eran **menores de**
25 años

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

RESULTADOS DEL ESTUDIO 2

» **MÁS MUJERES PERMANECIERON VIH NEGATIVAS CON APRETUDE QUE CON TRUVADA DURANTE EL ESTUDIO**

LAS TRANSMISIONES DEL VIH OCURRIERON APROXIMADAMENTE

12 VECES MENOS

CON APRETUDE QUE CON TRUVADA

APRETUDE

3 de 1,613 mujeres
recibieron un diagnóstico
de VIH positivo

VS

TRUVADA

36 de 1,610 mujeres
recibieron un diagnóstico
de VIH positivo

Los participantes utilizaron el producto durante una media de 1.2 años. Los resultados pueden variar.



Después de esta parte del estudio, los participantes fueron encuestados. **El 78 % de los que respondieron eligieron APRETUDE** en lugar de TRUVADA **como su opción de PrEP***

*Una vez finalizado el ensayo, se ofreció a los participantes la opción de continuar el estudio con APRETUDE o TRUVADA. De los 3,028 pacientes en el estudio, 2,472 (81%) tenían datos de preferencia disponibles. Quienes preferían la PrEP oral podrían haber optado por no participar en el estudio.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APRETUDE? (continúa)

APRETUDE puede causar efectos secundarios graves: (continúa)

- o **síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
- **Problemas hepáticos.** Han ocurrido problemas hepáticos en personas con o sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. **Llama a tu proveedor de salud de inmediato si tienes cualquiera de los siguientes síntomas:** tu piel o la parte blanca de tus ojos se pone amarilla; orina oscura o de color del té; heces de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; o picazón
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo.** **Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si desarrollas alguno de los siguientes síntomas:** tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la [Información para el Paciente](#) de APRETUDE.



HABLA CON TU PROVEEDOR DE SALUD SOBRE PROTECCIÓN CONTRA EL VIH

Es importante tener una conversación abierta con tu médico sobre las opciones de protección contra el VIH más adecuadas para ti. No todas las PrEP son iguales, por lo que encontrar la opción que se adapte a tus necesidades de salud y estilo de vida es fundamental.

» CONSEJOS ÚTILES PARA HABLAR CON TU PROVEEDOR DE SALUD

- 1** **Pide una receta de APREUDE:**
Pide APREUDE por su nombre
- 2** **Di que prefieres protección de acción prolongada:**
Coméntale a tu proveedor de salud que podrías beneficiarte de una protección que dura 2 meses
- 3** **Habla sobre las dificultades con las pastillas diarias:**
Comparte si has tenido problemas para seguir un régimen diario de pastillas según lo recetado

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APREUDE? (continúa)

Los efectos secundarios más comunes de APREUDE incluyen:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, hematomas, enrojecimiento, picazón, calor, pérdida de sensibilidad en el lugar de la inyección, absceso y decoloración; diarrea; dolor de cabeza; fiebre; cansancio; problemas para dormir; náuseas; mareos; gases; dolor de estómago; vómitos; dolores musculares; erupción cutánea; pérdida del apetito; somnolencia; dolor de espalda; o infección de las vías respiratorias superiores
- Estos no son todos los posibles efectos secundarios de APREUDE. Llama a tu proveedor de salud para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la [Información para el Paciente de APREUDE](#).



Apretude
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

ENTIENDE TU COBERTURA Y BENEFICIOS

Antes de tu primera cita o receta, infórmate sobre la cobertura de tu Seguro médico comunicándote con ViiVConnect. Una vez confirmes que APRETUDE es adecuado para ti, entender los beneficios que incluye tu cobertura te ayudará a determinar los próximos pasos.

»» COMUNÍCATE CON VIIVCONNECT PARA HABLAR CON UN REPRESENTANTE EN VIVO SOBRE:



Verificar si calificas para programas de ahorro o asistencia*



Entender tu cobertura de seguro y confirmar tus beneficios



Obtener ayuda para apelar una petición denegada o con cualquier otra pregunta que puedas tener

*Sujeto a elegibilidad y términos y condiciones del programa; los programas de ViiVConnect no constituyen un seguro médico. Se aplican restricciones.

ViiVConnect

»» OBTÉN AYUDA PERSONALIZADA

VISITA

viiVconnect.com/patient

0

LLAMA AL

1-844-588-3288

»» EL SEGURO MÉDICO Y LA PREP

La ley federal requiere que los planes de seguro médico cubran ciertos productos y servicios asociados a PrEP. Llama a tu compañía de seguro médico para ver cómo te afecta esto.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

Antes de recibir APRETUDE, infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- alguna vez has tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir
- tienes o has tenido problemas hepáticos
- alguna vez has tenido problemas de salud mental
- estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si APRETUDE dañará a tu bebé en gestación. APRETUDE puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección. Informa a tu proveedor de salud si quedas embarazada mientras recibes o después de recibir APRETUDE
- estás amamantando o planeas hacerlo. APRETUDE podría pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé mientras recibes o después de recibir APRETUDE

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

• Algunos medicamentos pueden interactuar con APRETUDE. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud**

 **Apretude**
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la Información para el Paciente de APRETUDE.

APOYO PARA MANTENERTE EN TU A-GAME

Para obtener descuentos en APRETUDE, ¡únete hoy mismo al programa de copago ViiVConnect!

» DESCUENTO EN APRETUDE

Los descuentos en APRETUDE con receta pueden estar disponibles a través del programa de copago ViiVConnect. **Los pacientes elegibles pueden pagar tan solo \$0 de copago por inyección.** Si cumples con los requisitos, asegúrate de dar los detalles de tu programa de copago a tu proveedor de salud o a la farmacia.

Obtén más información en es.APRETUDE.com

Sujeto a la elegibilidad del programa y a sus términos y condiciones. Los programas de ViiVConnect no constituyen un seguro médico. Se aplican restricciones.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cómo se me administrará APRETUDE?

- APRETUDE se te administrará en forma de inyección por tu proveedor de salud
- APRETUDE se administra inicialmente mediante una inyección en el glúteo 1 vez al mes durante los primeros 2 meses y luego mediante una inyección 1 vez cada 2 meses
- Antes de recibir tu primera inyección de APRETUDE, tu proveedor de salud puede pedirte que tomes 1 pastilla de cabotegravir oral 1 vez al día durante 1 mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia al cabotegravir
- APRETUDE es un medicamento de acción prolongada y puede permanecer en tu cuerpo durante 12 meses o más después de la última inyección
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud mientras recibas APRETUDE. Es importante que recibas APRETUDE según lo programado
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de APRETUDE por más de 7 días, llama de inmediato a tu proveedor de salud para analizar tus opciones de PrEP
- Si dejas de recibir APRETUDE, habla con tu proveedor de salud acerca de otras opciones para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1



Apretude
cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension
for PrEP pre-exposure prophylaxis

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información de prescripción completa y la [Información para el Paciente de APRETUDE](#).



Apretude

cabotegravir 200 mg/mL
extended-release injectable suspension

PREGUNTA SOBRE APRETUDE.

Se recomienda que informes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088.

También puedes notificar efectos secundarios negativos a ViiV en gsk.public.reportum.com o al 1-877-844-8872.

Consulta la Información Importante de Seguridad en este folleto, incluyendo una Advertencia Importante.
Consulta la Información de prescripción completa y la [Información para el Paciente de APRETUDE](#).



TRUVADA is owned by Gilead Sciences, Inc. All other trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.
©2026 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBTBROC260004_SPAN August 2026
Produced in USA.