

Lista de verificación paso a paso

Prepara tu cobertura

- Verifica tu cobertura y costos:** Podrás confirmar tu cobertura médica y la información de copagos en el consultorio de tu médico, con un profesional administrativo de ASO o un asesor de PrEP.
- Podrías ser elegible para pagar tan solo \$0 de copago. Obtén más información en APRETUDECopayProgram.com.** Si calificas para un copago de \$0, proporciona los códigos del cupón a tu proveedor de salud y farmacia especializada.

Prepárate

- Hazte la prueba del VIH.** Debes ser VIH 1 negativo para recibir APRETUDE, por lo tanto, debes hacerte la prueba antes de comenzar y antes de cada inyección posterior.
- Establece un Día de Inyección Programado.** Tú y tu proveedor de salud escogerán 1 día cada 2 meses para tu inyección de APRETUDE. APRETUDE es administrado por un proveedor de salud cada 2 meses después de que hayas recibido inyecciones de inicio con 1 mes de diferencia durante 2 meses consecutivos.
Tienes un Periodo Flexible de Inyección que abarca desde 7 días antes y hasta 7 días después de tu Día de Inyección Programado. Si no puedes asistir a tu Día de Inyección Programado, asegúrate de contactar a tu proveedor de salud de inmediato para hacer una nueva cita dentro de tu Periodo Flexible de Inyección y evaluar tus opciones.
- Asegúrate de contestar el teléfono cuando la farmacia especializada te llame.** La farmacia especializada te llamará para obtener tu consentimiento para surtir la receta y garantizar que la inyección se envíe a tiempo a tu médico; la llamada podría provenir de un número 1-800 desconocido.

Prepárate para APRETUDE

- Durante tu cita,** un proveedor de salud capacitado te administrará una inyección en el músculo del glúteo.

¿Qué es APRETUDE?

APRETUDE es un medicamento recetado que se usa como PrEP del VIH 1 para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1 en adultos y adolescentes que pesan al menos 77 libras (al menos 35 kg).

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de APRETUDE?

Información importante para las personas que reciben APRETUDE como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a reducir su riesgo de contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH 1):


Antes de recibir APRETUDE para reducir tu riesgo de contraer el VIH 1, debes ser VIH 1 negativo para comenzar con APRETUDE. No recibas APRETUDE a menos que te hagas una prueba y confirmes que eres VIH 1 negativo.

- **Algunas pruebas de VIH 1 pueden no detectar la infección por VIH 1 en una persona que se haya infectado recientemente.** Informa a tu proveedor de salud si has tenido una enfermedad similar a la gripe en el mes anterior a comenzar con APRETUDE o en cualquier momento mientras recibas APRETUDE. Los síntomas de una nueva infección por VIH 1 incluyen: cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dolor de garganta; erupción cutánea; ganglios linfáticos inflamados en el cuello o la ingle; fiebre; dolor de cabeza; vómitos o diarrea; o sudores nocturnos

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de esta guía, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la Información Importante sobre APRETUDE en la página 4.



GRACIAS POR
ELEGIR



INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Qué es lo más importante que debo saber acerca de APRETUDE? (continúa)

Mientras recibas APRETUDE como PrEP para el VIH 1: (continúa)

- **APRETUDE no previene otras infecciones de transmisión sexual (ITS). Practica relaciones sexuales más seguras mediante el uso de un condón de látex o poliuretano para reducir el riesgo de contraer ITS**
- **Debes permanecer VIH 1 negativo para continuar recibiendo APRETUDE como PrEP para el VIH 1**
 - Conoce tu estado respecto al VIH 1, así como el estado de tus parejas. Si crees que estuviste expuesto al VIH 1, informa a tu proveedor de salud de inmediato
 - Tu riesgo de contraer el VIH 1 es menor si tus parejas con VIH 1 están recibiendo un tratamiento eficaz
 - Hazte la prueba del VIH 1 con cada inyección de APRETUDE o cuando te lo indique tu proveedor de salud. No te saltes ninguna prueba del VIH 1. Si contraes el VIH 1 y continúas recibiendo APRETUDE porque no sabes que estás infectado por el VIH 1, la infección por VIH 1 puede volverse más difícil de tratar
 - Hazte la prueba de otras ITS. Estas infecciones facilitan la infección por VIH 1
 - Habla con tu proveedor de salud sobre las maneras de reducir tu riesgo de contraer el VIH 1
 - No te saltes ninguna inyección de APRETUDE. No cumplir con las inyecciones aumenta tu riesgo de contraer la infección por VIH 1

¿Quién no debería recibir APRETUDE?

No recibas APRETUDE si:

- **ya tienes VIH 1 o no conoces tu estado respecto al VIH 1.** Si eres VIH 1 positivo, debes tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APRETUDE solo puede ayudar a reducir tu riesgo de contraer la infección por VIH 1 **antes** de infectarte. **Si tienes VIH 1 y solo recibes APRETUDE, con el tiempo, tu VIH 1 puede volverse más difícil de tratar**
- eres alérgico al cabotegravir
- estás tomando ciertos medicamentos: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; o rifapentine

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APRETUDE?

APRETUDE puede causar efectos secundarios graves:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar APRETUDE. **Deja de recibir APRETUDE y solicita atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea con alguna de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua
- **Problemas hepáticos.** Han ocurrido problemas hepáticos en personas con o sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. **Llama a tu proveedor de salud de inmediato si tienes cualquiera de los siguientes síntomas:** tu piel o la parte blanca de tus ojos se pone amarilla; orina oscura o de color del té; heces de color claro; náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; o picazón
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si desarrollas alguno de los siguientes síntomas: tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño

Consulta la Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de esta guía, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo. Consulta la [Información Importante sobre APRETUDE](#) en la página 4.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD (continúa)

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de APRETUDE? (continúa)

Los efectos secundarios más comunes de APRETUDE incluyen:

- Dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, hematomas, enrojecimiento, picazón, calor, pérdida de sensibilidad en el lugar de la inyección, absceso y decoloración; diarrea; dolor de cabeza; fiebre; cansancio; problemas para dormir; náuseas; mareos; gases; dolor de estómago; vómitos; dolores musculares; erupción cutánea; pérdida del apetito; somnolencia; dolor de espalda; o infección de las vías respiratorias superiores
- Estos no son todos los posibles efectos secundarios de APRETUDE. Llama a tu proveedor de salud para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios

Antes de recibir APRETUDE, infórmale a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- alguna vez has tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir
- tienes o has tenido problemas hepáticos
- alguna vez has tenido problemas de salud mental
- estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si APRETUDE dañará a tu bebé en gestación. APRETUDE puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección. Informa a tu proveedor de salud si quedas embarazada mientras recibes o después de recibir APRETUDE
- estás amamantando o planeas hacerlo. APRETUDE podría pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé mientras recibes o después de recibir APRETUDE

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales.

- Algunos medicamentos pueden interactuar con APRETUDE. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico. **No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud**

¿Cómo se me administrará APRETUDE?

- APRETUDE se te administrará en forma de inyección por tu proveedor de salud
- APRETUDE se administra inicialmente mediante una inyección en el glúteo 1 vez al mes durante los primeros 2 meses y luego mediante una inyección 1 vez cada 2 meses
- Antes de recibir tu primera inyección de APRETUDE, tu proveedor de salud puede pedirte que tomes 1 pastilla de cabotegravir oral 1 vez al día durante 1 mes (al menos 28 días) para evaluar tu tolerancia al cabotegravir
- APRETUDE es un medicamento de acción prolongada y puede permanecer en tu cuerpo durante 12 meses o más después de la última inyección
- Mantente bajo el cuidado de un proveedor de salud mientras recibas APRETUDE. Es importante que recibas APRETUDE según lo programado
- Si no cumples o planeas no cumplir con tu inyección programada de APRETUDE por más de 7 días, llama de inmediato a tu proveedor de salud para analizar tus opciones de PrEP
- Si dejas de recibir APRETUDE, habla con tu proveedor de salud acerca de otras opciones para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1

Te recomendamos que reportes los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA.

Visita www.fda.gov/medwatch o llama al 1-800-FDA-1088. También puedes notificar efectos secundarios negativos a ViiV en gsk.public.reportum.com o al 1-877-844-8872.

Consulta la [Información para el Paciente](#) de APRETUDE y coméntala con tu proveedor de salud.

Consulta la [Información Importante de Seguridad adicional a lo largo de esta guía, incluyendo una Advertencia Importante sobre el riesgo de resistencia a los medicamentos si pasas a ser VIH positivo.](#)

Consulta la [Información Importante sobre APRETUDE](#) en la página 4.



Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.
©2025 ViiV Healthcare or licensor.
PMUS-CBTBROC250024_SPAN October 2025
Produced in USA.



Datos Importantes sobre APRETUDE

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre APRETUDE y no reemplaza la conversación con tu proveedor de salud sobre tu medicamento.

A-pre-tud

LA INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE APRETUDE

Información importante para las personas que reciben APRETUDE como profilaxis preexposición (PrEP) para ayudar a reducir su riesgo de contraer la infección por el virus de inmunodeficiencia humana 1 (VIH 1):

Antes de recibir APRETUDE para reducir tu riesgo de contraer el VIH 1:

- **Debes ser VIH 1 negativo para comenzar con APRETUDE. Debes hacerte una prueba para asegurarte de que no estás ya infectado de VIH 1.**
- **No recibas APRETUDE como PrEP para el VIH 1 a menos que se confirme que eres VIH 1 negativo.**
- Algunas pruebas de VIH 1 pueden no detectar la infección por VIH 1 en una persona que se haya infectado recientemente. Si tienes síntomas similares a los de la gripe, podrías haberte infectado recientemente de VIH 1. Informa a tu proveedor de salud si has tenido una enfermedad similar a la gripe en el mes anterior a comenzar con APRETUDE o en cualquier momento mientras recibas APRETUDE. Los síntomas de una nueva infección por VIH 1 incluyen: cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dolor de garganta; erupción cutánea; ganglios linfáticos inflamados en el cuello o la ingle; fiebre; dolor de cabeza; vómitos o diarrea; sudores nocturnos.

Mientras recibas APRETUDE como PrEP para el VIH 1:

- **APRETUDE no previene otras infecciones de transmisión sexual. Practica relaciones sexuales más seguras utilizando un condón de látex o poliuretano para reducir el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual.**
- **Debes permanecer VIH 1 negativo para continuar recibiendo APRETUDE como PrEP para el VIH 1.**
 - Conoce tu estado de VIH 1 y el estado de VIH 1 de tus parejas.
 - Pregunta a tus parejas con VIH 1 si están tomando medicamentos para el VIH 1 y tienen una carga viral indetectable. Una carga viral indetectable es cuando la cantidad de virus en la sangre es demasiado baja como para medirla en una prueba de laboratorio. Para mantener una carga viral indetectable, tus parejas deben seguir tomando medicamentos para el VIH 1 según lo recetado. Tu riesgo de contraer el VIH 1 es menor si tus parejas con VIH 1 están recibiendo un tratamiento eficaz.
 - Hazte la prueba del VIH 1 con cada inyección de APRETUDE o cuando te lo indique tu proveedor de salud. No te saltes ninguna prueba del VIH 1. Si contraes el VIH 1 y continúas recibiendo APRETUDE porque no sabes que estás infectado por el VIH 1, la infección por VIH 1 puede volverse más difícil de tratar.
 - Hazte la prueba de otras infecciones de transmisión sexual, como la sífilis, la clamidia y la gonorrea. Estas infecciones facilitan que puedas infectarte de VIH 1.
 - Si crees que has estado expuesto al VIH 1, informa a tu proveedor de salud de inmediato. Es posible que quiera hacerte más pruebas para asegurarse de que sigues siendo VIH 1 negativo.
 - Obtén información y apoyo para ayudar a reducir prácticas sexuales de riesgo.
 - No te saltes ninguna inyección de APRETUDE. No cumplir con las inyecciones aumenta tu riesgo de contraer la infección por VIH 1.
 - Si te conviertes en VIH 1 positivo, tendrás que tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APRETUDE no está aprobado para el tratamiento del VIH 1.

Si tienes VIH 1 y solo recibes APRETUDE, con el tiempo, tu VIH 1 puede volverse más difícil de tratar.

ACERCA DE APRETUDE

APRETUDE es un medicamento recetado que se usa como PrEP del VIH 1 para reducir el riesgo de contraer la infección por VIH 1 en adultos y adolescentes que pesan al menos 77 libras (al menos 35 kg).

El VIH 1 es el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Se desconoce si APRETUDE es seguro y eficaz en niños menores de 12 años o que pesen menos de 77 libras (menos de 35 kg).

NO RECIBAS APRETUDE SI:

- **ya estás infectado de VIH 1.** Si eres VIH 1 positivo, deberás tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APRETUDE no está aprobado para el tratamiento del VIH 1.
- **no conoces tu estado de VIH 1.** Tal vez ya seas VIH 1 positivo. Debes tomar otros medicamentos para tratar el VIH 1. APRETUDE solo puede ayudar a reducir tu riesgo de contraer la infección por VIH 1 **antes** de infectarte.
- eres alérgico al cabotegravir.
- estás tomando alguna de las siguientes medicinas: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; rifapentine.

ANTES DE RECIBIR APRETUDE

Infórmele a tu proveedor de salud sobre todas tus condiciones médicas, incluido si:

- alguna vez has tenido una erupción cutánea o una reacción alérgica a medicamentos que contengan cabotegravir.
- tienes o has tenido problemas hepáticos.
- alguna vez has tenido problemas de salud mental.
- estás embarazada o planeas quedar embarazada. Se desconoce si APRETUDE dañará a tu bebé en gestación. APRETUDE puede permanecer en tu cuerpo hasta por 12 meses o más después de la última inyección. Informa a tu proveedor de salud si quedas embarazada mientras recibes o después de recibir APRETUDE.
- estás amamantando o planeas amamantar. APRETUDE podría pasar a tu leche materna. Habla con tu proveedor de salud acerca de la mejor manera de alimentar a tu bebé mientras recibes o después de recibir APRETUDE.

Informa a tu proveedor de salud sobre todos los medicamentos que tomas, incluidos medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos herbales. Algunos medicamentos pueden interactuar con APRETUDE. Mantén una lista de tus medicamentos y muéstrasela a tu proveedor de salud y a tu farmacéutico cuando obtengas un nuevo medicamento. Puedes pedirle a tu proveedor de salud o a tu farmacéutico una lista de los medicamentos que interactúan con APRETUDE.

No comiences a tomar medicamentos nuevos sin informar a tu proveedor de salud. Tu proveedor de salud puede decirte si es seguro recibir APRETUDE con otros medicamentos.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE APRETUDE

APRETUDE puede causar efectos secundarios graves, incluido:

- **Reacciones alérgicas.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud si presentas una erupción cutánea al usar APRETUDE. **Deja de recibir APRETUDE y busca atención médica de inmediato si presentas una erupción cutánea con alguna de las siguientes señales o síntomas:** fiebre; sensación de malestar general; cansancio; dolores musculares o en las articulaciones; dificultad para respirar; ampollas o úlceras en la boca; ampollas; enrojecimiento o hinchazón de los ojos; hinchazón de la boca, la cara, los labios o la lengua.
- **Problemas hepáticos:** Han ocurrido problemas hepáticos en personas con o sin antecedentes de problemas hepáticos u otros factores de riesgo. Tu proveedor de salud podría realizar análisis de sangre para evaluar su función hepática. **Llama a tu proveedor de salud de inmediato si desarrollas cualquiera de las siguientes señales o síntomas de problemas hepáticos:** tu piel o la parte blanca de tus ojos se pone amarilla (ictericia); orina oscura o de color del té; heces de color claro (deposiciones); náuseas o vómitos; pérdida del apetito; dolor, molestias o sensibilidad en el lado derecho del área del estómago; picazón.
- **Depresión o cambios en el estado de ánimo.** Llama de inmediato a tu proveedor de salud o solicita ayuda médica de emergencia si desarrollas alguno de los siguientes síntomas: tristeza o desesperanza; ansiedad o inquietud; piensas en hacerte daño (suicidarte) o has tratado de hacerte daño.

Los efectos secundarios más comunes de APRETUDE incluyen: dolor, sensibilidad, una masa o bulto endurecido, hinchazón, hematomas, enrojecimiento, picazón, calor, pérdida de sensibilidad en el lugar de la inyección, absceso y decoloración; diarrea; dolor de cabeza; fiebre; cansancio; problemas para dormir; náuseas; mareos; gases; dolor de estómago; vómitos; dolor muscular; erupción cutánea; pérdida del apetito; somnolencia; dolor de espalda; infección de las vías respiratorias superiores.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de APRETUDE.

Llama a tu proveedor de salud para obtener asesoramiento médico sobre los efectos secundarios. Puedes reportar los efectos secundarios a la FDA en el 1-800-FDA-1088.

OBTÉN MÁS INFORMACIÓN

- Llama a tu proveedor de salud o farmacéutico.
- Visita [APRETUDE.com](https://www.apretude.com) o llama al 1-877-844-8872, donde también puedes obtener la información de etiquetado aprobada por la FDA.

September 2024 APR:3PIL

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2025 ViiV Healthcare o licensor.

PMUS-CBTBRFS240004_SPAN January 2025 Produced in USA.

Important Facts About APRETUDE

This is only a brief summary of important information about APRETUDE and does not replace talking to your healthcare provider about your medicine.

AP-reh-tood

MOST IMPORTANT INFORMATION ABOUT APRETUDE

Important information for people who receive APRETUDE for pre-exposure prophylaxis (PrEP) to help reduce their risk of getting human immunodeficiency virus-1 (HIV-1) infection:

Before receiving APRETUDE to reduce your risk of getting HIV-1:

- **You must be HIV-1 negative to start APRETUDE. You must get tested to make sure that you do not already have HIV-1 infection.**
- **Do not receive APRETUDE for HIV-1 PrEP unless you are confirmed to be HIV-1 negative.**
- Some HIV-1 tests can miss HIV-1 infection in a person who has recently become infected. If you have flu-like symptoms, you could have recently become infected with HIV-1. Tell your healthcare provider if you had a flu-like illness within the last month before starting APRETUDE or at any time while receiving APRETUDE. Symptoms of new HIV-1 infection include: tiredness; joint or muscle aches; sore throat; rash; enlarged lymph nodes in the neck or groin; fever; headache; vomiting or diarrhea; night sweats.

While you are receiving APRETUDE for HIV-1 PrEP:

- **APRETUDE does not prevent other sexually transmitted infections. Practice safer sex by using a latex or polyurethane condom to reduce the risk of getting sexually transmitted infections.**
- **You must stay HIV-1 negative to keep receiving APRETUDE for HIV-1 PrEP.**
 - Know your HIV-1 status and the HIV-1 status of your partners.
 - Ask your partners with HIV-1 if they are taking anti-HIV-1 medicines and have an undetectable viral load. An undetectable viral load is when the amount of virus in the blood is too low to be measured in a lab test. To maintain an undetectable viral load, your partners must keep taking HIV-1 medicine as prescribed. Your risk of getting HIV-1 is lower if your partners with HIV-1 are taking effective treatment.
 - Get tested for HIV-1 with each APRETUDE injection or when your healthcare provider tells you. You should not miss any HIV-1 tests. If you become HIV-1 infected and continue receiving APRETUDE because you do not know you are HIV-1 infected, the HIV-1 infection may become harder to treat.
 - Get tested for other sexually transmitted infections such as syphilis, chlamydia, and gonorrhea. These infections make it easier for HIV-1 to infect you.
 - If you think you were exposed to HIV-1, tell your healthcare provider right away. They may want to do more tests to be sure you are still HIV-1 negative.
 - Get information and support to help reduce sexual risk behaviors.
 - Do not miss any injections of APRETUDE. Missing injections increases your risk of getting HIV-1 infection.
 - If you do become HIV-1 positive, you will need to take other medicines to treat HIV-1. APRETUDE is not approved for treatment of HIV-1.

If you have HIV-1 and receive only APRETUDE, over time your HIV-1 may become harder to treat.

ABOUT APRETUDE

APRETUDE is a prescription medicine used for HIV-1 PrEP to reduce the risk of getting HIV-1 infection in adults and adolescents who weigh at least 77 pounds (at least 35 kg). HIV-1 is the virus that causes Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS). It is not known if APRETUDE is safe and effective in children younger than 12 years of age or weighing less than 77 pounds (less than 35 kg).

DO NOT RECEIVE APRETUDE IF YOU:

- **already have HIV-1 infection.** If you are HIV-1 positive, you will need to take other medicines to treat HIV-1. APRETUDE is not approved for treatment of HIV-1.
- **do not know your HIV-1 infection status.** You may already be HIV-1 positive. You need to take other medicines to treat HIV-1. APRETUDE can only help reduce your risk of getting HIV-1 infection **before** you are infected.
- are allergic to cabotegravir.
- are taking any of the following medicines: carbamazepine; oxcarbazepine; phenobarbital; phenytoin; rifampin; rifapentine.

BEFORE RECEIVING APRETUDE

Tell your healthcare provider about all your medical conditions, including if you:

- have ever had a skin rash or an allergic reaction to medicines that contain cabotegravir.
- have or have had liver problems.
- have ever had mental health problems.
- are pregnant or plan to become pregnant. It is not known if APRETUDE will harm your unborn baby. APRETUDE can remain in your body for up to 12 months or longer after the last injection. Tell your healthcare provider if you become pregnant while or after receiving APRETUDE.
- are breastfeeding or plan to breastfeed. APRETUDE may pass into your breast milk. Talk with your healthcare provider about the best way to feed your baby while or after receiving APRETUDE.

Tell your healthcare provider about all the medicines you take, including prescription and over-the-counter medicines, vitamins, and herbal supplements. Some medicines may interact with APRETUDE. Keep a list of your medicines and show it to your healthcare provider and pharmacist when you get a new medicine. You can ask your healthcare provider or pharmacist for a list of medicines that interact with APRETUDE.

Do not start a new medicine without telling your healthcare provider. Your healthcare provider can tell you if it is safe to receive APRETUDE with other medicines.

POSSIBLE SIDE EFFECTS OF APRETUDE

APRETUDE may cause serious side effects, including:

- **Allergic reactions.** Call your healthcare provider right away if you develop a rash with APRETUDE. **Stop receiving APRETUDE and get medical help right away if you develop a rash with any of the following signs or symptoms:** fever; generally ill feeling; tiredness; muscle or joint aches; trouble breathing; blisters or sores in mouth; blisters; redness or swelling of the eyes; swelling of the mouth, face, lips, or tongue.
- **Liver problems.** Liver problems have happened in people with or without a history of liver problems or other risk factors. Your healthcare provider may do blood tests to check your liver function. **Call your healthcare provider right away if you develop any of the following signs or symptoms of liver problems:** your skin or the white part of your eyes turns yellow (jaundice); dark or "tea-colored" urine; light-colored stools (bowel movements); nausea or vomiting; loss of appetite; pain, aching, or tenderness on the right side of your stomach area; itching.
- **Depression or mood changes.** **Call your healthcare provider or get medical help right away if you develop any of the following symptoms:** feeling sad or hopeless; feeling anxious or restless; have thoughts of hurting yourself (suicide) or have tried to hurt yourself.

The most common side effects of APRETUDE include: pain, tenderness, hardened mass or lump, swelling, bruising, redness, itching, warmth, loss of sensation at the injection site, abscess, and discoloration; diarrhea; headache; fever; tiredness; sleep problems; nausea; dizziness; passing gas; stomach pain; vomiting; muscle pain; rash; loss of appetite; drowsiness; back pain; upper respiratory infection.

These are not all the possible side effects of APRETUDE.

Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.

GET MORE INFORMATION

- Talk to your healthcare provider or pharmacist.
- Go to APRETUDE.com or call 1-877-844-8872 where you can also get FDA-approved labeling.

September 2024 APR:4PIL

Trademarks are owned by or licensed to the ViiV Healthcare group of companies.

©2025 ViiV Healthcare or licensor.

PMUS-CBTBRFS240003 January 2025 Produced in USA. 0002-0035-01